

## correcties DSM-5<sup>®</sup> : Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen

### Derde oplage, mei 2015

In deze lijst zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen t.o.v. de tweede oplage (november 2014).

Pagina	Stoornis	Eerste en tweede oplage	Wijziging in derde oplage_februari 2015
-,- [door het hele boek]		uitingsvormen van lijdensdruk ( <i>idioms of distress</i> )	Idiomen voor lijdensdruk
-,-		automatische spraak gedesorganiseerde spraak geen begrijpelijke spraak repetetieve spraak versnelde spraak	automatisch spreken gedesorganiseerd spreken niet begrijpelijk spreken repetitief spreken versneld spreken
p. 14	DSM-5-classificatietabel	Depressieve-stemmingsstoornis, laatste regel: Met <u>seizoenspatroon</u>	Met <u>seizoensgebonden patroon</u>
p. 15		<b>293.83 Depressieve-stemmingsstoornis door een somatische aandoening</b> Specificeer indien: Met depressieve kenmerken; Met <u>volledige</u> depressieve episode; Met gemengde kenmerken	<b>293.83 Depressieve-stemmingsstoornis door een somatische aandoening</b> Specificeer indien: Met depressieve kenmerken; Met <del>volledige</del> depressieve episode; Met gemengde kenmerken
P. 388	Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen	<b>Bijkomende kenmerken die de classificatie ondersteunen</b> [Zin toegevoegd na:] Daarom is het niet ongebruikelijk dat kinderen met deze stoornis geen actuele verschijnselen van verwaarlozing vertonen.	Daarom is het niet ongebruikelijk dat kinderen met deze stoornis geen actuele verschijnselen van verwaarlozing vertonen. <u>Bovendien kan de ontremd-sociaalcontactstoornis ook voorkomen bij kinderen die geen tekenen van een verstoorde</u>

# DSM-5<sup>®</sup>

			<u>hechting vertonen.</u>
p. 628	Oppositionele-opstandige stoornis	<b>A</b> Een patroon bestaand uit een boze / prikkelbare stemming, brutaal / <u>openlijk ongehoorzaam</u> gedrag, of ontevredenheid,	<b>A</b> Een patroon bestaand uit een boze / prikkelbare stemming, brutaal / <u>uitdagend</u> gedrag, of ontevredenheid,
p. 630		<b>Ruziezoekend /openlijk ongehoorzaam gedrag</b>	<b>Ruziezoekend /uitdagend gedrag</b>
p. 631		<b>Diagnostische kenmerken</b> Het hoofdkenmerk van de oppositionele-opstandige stoornis is een frequent voorkomend en persisterend patroon van een boze of prikkelbare stemming, brutaal of <u>ongehoorzaam</u> gedrag of ontevredenheid	<b>Diagnostische kenmerken</b> Het hoofdkenmerk van de oppositionele-opstandige stoornis is een frequent voorkomend en persisterend patroon van een boze of prikkelbare stemming, brutaal of <u>uitdagend</u> gedrag of ontevredenheid
p. 872	Borderline-persoonlijkheidsstoornis	<b>8</b> Inadequate, intense woede, of moeite hebben boosheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente <u>woedeaanvallen</u> , constante boosheid, recidiverende vechtpartijen).	<b>8</b> Inadequate, intense woede, of moeite hebben boosheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente <u>woede-uitbarstingen</u> , constante boosheid, recidiverende vechtpartijen).
p. 936, 936, 942, 944 p. 938	Antidepressiva-discontinueringssyndroom Andere bijwerkingen van medicatie Andere problemen die een reden tot zorg kunnen zijn	[voetnoot toegevoegd aan de koppen:] <b>Antidepressiva-discontinueringssyndroom</b> <b>Andere bijwerkingen van medicatie</b> <b>Problemen door mishandeling en verwaarlozing van een kind</b> <b>Problemen door mishandeling en verwaarlozing van een volwassene</b>	[tekst voetnoot] De Amerikaanse editie maakt onderscheid tussen vermoedelijk(e) en bevestigd(e) mishandeling, misbruik of verwaarlozing, en tussen eerste en vervolconsulten; in de Nederlandse editie geldt voor alle situaties dezelfde code.
p.1003		Punt toegevoegd aan de opsomming.	<b>&gt;Verklarende woordenlijst van culturele concepten van lijdensdruk</b> Dit hoofdstuk in de appendix geeft een aantal voorbeelden van gedegen onderzochte culturele concepten van lijdensdruk, ter illustratie van het belang van

			culturele informatie voor de klinische diagnostiek. Ook beschrijft het een aantal verbanden tussen culturele syndromen, idiomen voor lijdensdruk en causale verklaringen.
p. 1099-1105		Hoofdstuk in het nawerk toegevoegd.	<b>Verklarende woordenlijst van culturele concepten van lijdensdruk</b>
p. 1111-1143	Alfabetische en Numerieke lijst met DSM-5-classificaties en ICD-9-CM-coderingen	Lijsten zijn vervangen door uitgebreidere lijsten, die identiek zijn aan de Amerikaanse versie.	

## Tweede oplage, november 2014

In deze lijst zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen t.o.v. de eerste oplage.

Pagina	Stoornis	Eerste druk	Wijziging in tweede oplage_november 2014
-, -	Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen	<u>Trauma</u> - en stressorgerelateerde stoornissen	<u>Psychotrauma</u> - en stressorgerelateerde stoornissen
-, -	Laagbegaafdheid	V62.89 <u>Laagbegaafdheid</u>	V62.89 <u>Zwakbegaafdheid</u>
p. 67	Culturele kwesties	<b>3</b> <u>Culturele verklaringen of subjectief</u>	<b>3</b> <u>Culturele verklaringen van subjectief</u>
p. 152	Voorlopige ticstoornis	<b>B</b> De tics zijn aanwezig gedurende <u>meer</u> dan een jaar sinds het begin van de tics.	<b>B</b> De tics zijn aanwezig gedurende <u>minder</u> dan een jaar sinds het begin van de tics.
p. 189	Psychotische stoornis door een middel/medicatie	<b>C</b> ... sprake is van een <u>onafhankelijke</u> psychotische stoornis	<b>C</b> ... sprake is van een <u>onafhankelijke</u> psychotische stoornis
p. 245	Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis	<b>A</b> Ernstige recidiverende <u>driftbuien</u> die zich verbaal (verbale agressie) en / of in het gedrag (fysieke agressie jegens personen of eigendommen) manifesteren en die wat intensiteit of duur betreft in grove mate disproportioneel zijn ten opzichte van de situatie of de aanleiding. <b>B</b> De <u>driftbuien</u> komen niet overeen met het ontwikkelingsniveau.	<b>A</b> Ernstige recidiverende <u>woede-uitbarstingen</u> die zich verbaal (verbale agressie) en / of in het gedrag (fysieke agressie jegens personen of eigendommen) manifesteren en die wat intensiteit of duur betreft in grove mate disproportioneel zijn ten opzichte van de situatie of de aanleiding. <b>B</b> De <u>woede-uitbarstingen</u> komen niet overeen met het ontwikkelingsniveau.

# DSM-5<sup>®</sup>

Pagina	Stoornis	Eerste druk	Wijziging in tweede oplage november 2014
		<p><b>C</b> De <u>driftbuien</u> treden gemiddeld drie keer of vaker per week op.</p> <p><b>D</b> De stemming tussen <u>de driftbuien</u> is persistentend prikkelbaar of boos,</p>	<p><b>C</b> De <u>woede-uitbarstingen</u> treden gemiddeld drie keer of vaker per week op.</p> <p><b>D</b> De stemming tussen <u>de woede-uitbarstingen</u> is persistentend prikkelbaar of boos,</p>
p. 335	Gegeneraliseerde-angststoornis	Bij de obsessieve-compulsieve stoornis zijn de obsessies <u>onjuiste</u> ideeën die de vorm aannemen van intrusieve en ongewenste gedachten, impulsen of voorstellingen.	Bij de obsessieve-compulsieve stoornis zijn de obsessies <u>ongepaste</u> ideeën die de vorm aannemen van intrusieve en ongewenste gedachten, impulsen of voorstellingen.
p. 551	Non-remslaap-arousalstoornissen	<p>&gt; Specificeer of:</p> <p><b>Type slaapwandelen</b></p> <p>&gt; Specificeer indien:</p> <p><b>Met slaapgerelateerd eten</b></p> <p><b>Met slaapgerelateerd seksueel gedrag (sexsomnia)</b></p> <p><b>Type pavor nocturnus</b></p>	<p>&gt; Specificeer of:</p> <p><b>Type slaapwandelen</b></p> <p><b>Type pavor nocturnus</b></p> <p>&gt; Specificeer indien:</p> <p><b>Met slaapgerelateerd eten</b></p> <p><b>Met slaapgerelateerd seksueel gedrag (sexsomnia)</b></p>
p. 630	Oppositionele-opstandige stoornis	Voor kinderen tot 5 jaar moet het gedrag, <u>tenzij anders vermeld</u> , gedurende minstens zes maanden op de meeste dagen zijn voorgekomen (criterium A8). Voor mensen vanaf de leeftijd van 5 jaar moet het gedrag, <u>tenzij anders vermeld</u> , gedurende minstens zes maanden minstens een keer per week zijn voorgekomen (criterium A8).	Voor kinderen tot 5 jaar moet het gedrag, <del>tenzij anders vermeld</del> , gedurende minstens zes maanden op de meeste dagen zijn voorgekomen ( <u>met uitzondering van</u> criterium A8). Voor mensen vanaf de leeftijd van 5 jaar moet het gedrag, <del>tenzij anders vermeld</del> , gedurende minstens zes maanden minstens een keer per week zijn voorgekomen ( <u>met uitzondering van</u> criterium A8).
p. 752	Stoornis in het gebruik van een stimulantium	<b>6</b> Aanhoudend stimulantiumgebruik ondanks persistentende of recidiverende sociale of interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten van het <u>middel</u> .	<b>6</b> Aanhoudend stimulantiumgebruik ondanks persistentende of recidiverende sociale of interpersoonlijke problemen, veroorzaakt of verergerd door de effecten van het <u>stimulantium</u> .
p. 804- 817-819, 841	Neurocognitieve stoornissen	parkinsonisme door <u>antipsychotica</u>	parkinsonisme door <u>neuroleptica</u>

# DSM-5<sup>®</sup>

Pagina	Stoornis	Eerste druk	Wijziging in tweede oplage_november 2014
p. 866	Antisociale- persoonlijkheidsstoornis	<b>2</b> <u>Onbetrouwbaarheid</u> , zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen,	<b>2</b> <u>Bedrog</u> , zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen,
p. 872	Borderline- persoonlijkheidsstoornis	<b>8</b> Inadequate, intense woede, of moeite hebben boosheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente <u>driftbuien</u> , constante boosheid, recidiverende vechtpartijen).	<b>8</b> Inadequate, intense woede, of moeite hebben boosheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente <u>woedeaanvallen</u> , constante boosheid, recidiverende vechtpartijen).
p. 953		<b>Coderingsaanwijzing</b> Eerst moet de bijbehorende psychische stoornis worden gecodeerd (bijvoorbeeld <u>volledige</u> neurocognitieve stoornis, autismespectrumstoornis),	<b>Coderingsaanwijzing</b> Eerst moet de bijbehorende psychische stoornis worden gecodeerd (bijvoorbeeld <u>uitgebreide</u> neurocognitieve stoornis, autismespectrumstoornis),
p. 980-985	WHODAS	Variant zonder onderstrepingen	Is vervangen door: Variant mét onderstrepingen